

Skupina / liečivo	Medicinálne uhlie	Diosmektit	Difenoxylát	Loperamid	Nifuroxazid	Rifaximin	Bezzárodkový vodný substrát produktov metabolismu*	Saccharomyces boulardii	Racekadotril
Zaradenie	OTC liek	OTC liek	Rx liek	OTC liek	OTC liek	Rx liek	OTC liek	OTC liek	OTC / Rx liek
Účinnosť na rôzne typy hnačky	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Vek obmedzenie	Od 3 rokov	Nie	Nad 5 rokov	Od 6 rokov. Maximálna denná dávka podľa hmotnosti dieťaťa	Nad 6 rokov	Nad 12 rokov	Od 2 rokov	Nie	Nie
Tehotenstvo, dojčenie	Áno Okrem lieku s obsahom bizmutu	Áno	U tehotných zvážiť pomer benefit / riziko. U dojčiacich nepoužívať.	Neodporúča sa	Neodporúča sa. Dojčenie: krátkodobo, pod dohľadom lekára.	Neodporúča sa	Áno	Zvážiť pomer benefit / riziko	Neodporúča sa
Systematické pôsobenie	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Ovplyvnenie črevnej peristaltiky	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Sfarbenie stolice	Čierne sfarbenie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie Sfarbuje na červeno moč	Nie	Nie	Nie
Kontraindikácie	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Nie
Iné upozornenia	2 hodinový interval medzi podaním liekov. Znížená účinnosť hormonálnej antikoncepcie.		Zvyšuje účinky alkoholu a liečiv pôsobiach na CNS.	Opatrnosť pri poškodení pečene. KI: krv v stolici, vysoká horúčka. Vysadiť, ak sa objaví zápcha alebo nadúvanie. NÚ: únava, závraty alebo ospalosť. Opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhu strojov.	Vhodný pri liečbe cestovateľskej hnačky, nie na jej prevenciu	Znižuje účinok p.o. estrogénových antikoncepčných prípravkov. NÚ: únava, závraty alebo ospalosť. Opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhu strojov.	Užívať pred jedlom alebo počas jedla s malým množstvom tekutiny, nezapijať mliekom. Neužívať súčasne lieky na úpravu pH žalúdka.	2 hodinový interval pred podaním antibiotík. Nesmie sa súčasne s perorálnymi antimykotikami. Nemá sa miešať s veľmi chladným ani veľmi teplým nápojom alebo jedlom a ani s alkoholickým nápojom.	Súbežné užívanie racekadotrilu a ACE inhibítorov môže zvýšiť riziko vzniku angioedému. Obsahuje laktózu. Nemá sa používať pri hnačkách spojených s užívaním antibiotík.

KI – okrem precitlivosti na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok. Rx – viazaný na lekársky predpis. OTC – neviazaný na lekársky predpis, voľnopredajný liek. NÚ – nežiaduce účinky

*Bezzárodkový vodný substrát produktov metabolismu *Escherichia coli*, *Streptococcus faecalis*, *Lactobacillus acidophilus* a *helveticus*